

INDIKATIONSSTELLUNG

| Berufliche Exposition | Viruslast (VL) bei Indexperson > 50 Kopien/ml oder unbekannt | VL bei Indexperson < 50 Kopien/ml |
|--|--|-----------------------------------|
| Perkutane (blutende) Stichverletzung mit Injektions- oder anderer Hohlraumnadel; Schnittverletzung mit kontaminiertem Skalpell, Messer o. ä. | Empfehlen | Anbieten |
| Oberflächliche Verletzung (z. B. mit chirurgischer Nadel) ohne Blutfluss; Kontakt von Schleimhaut oder verletzter / geschädigter Haut mit Blut; BAL-Spritzer in das Auge | Anbieten | Nicht indiziert |
| Perkutaner Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Blut, Urin, Speichel); Schleimhautkontakt mit Körperflüssigkeiten wie Urin oder Speichel | Nicht indiziert | Nicht indiziert |
| Parenterale Exposition | PEP-Indikation | |
| Versehentliche Transfusion von HIV-haltigen Blutkonserven oder Erhalt von mit hoher Wahrscheinlichkeit HIV-haltigen Blutprodukten oder Organen | Empfehlen | |
| Nutzung eines HIV-kontaminierten Injektionsbestecks | Empfehlen | |
| Gemeinsame Nutzung eines Injektionsbesteckes ohne Kenntnis des HIV-Status der anderen Drogengebrauchenden | Anbieten | |
| Verletzung an altem, weggeworfenem Spritzenbesteck (z. B. bei spielenden Kindern) | Nicht indiziert | |
| Sexuelle Exposition | PEP-Indikation | |
| Ungeschützter vaginaler oder analer Geschlechtsverkehr, Indexpatient bekannt HIV-positiv | HIV unbehandelt/VL > 1000 Kopien/ml oder Behandlungsstatus nicht zu eruieren Empfehlen | |
| | VL 50 – 1000 Kopien/ml Anbieten | |
| | VL < 50 Kopien/ml Nicht indiziert | |
| <i>Unbekannter HIV-Status der Indexperson</i> | | |
| Ungeschützter Analverkehr zwischen Männern | Anbieten | |
| Ungeschützter heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr mit aktiv intravenös drogenkonsumierendem Partner, mit bisexuellem Partner, mit Partner aus HIV-Hochprävalenzregion (vor allem Subsahara-Afrika) | | |
| Bei Vergewaltigung/sexualisierter Gewalt | Bei ungeschütztem Anal-/Vaginalverkehr Anbieten | |
| Ungeschützter heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr (auch mit Sexarbeiterin, wenn nicht aus Subsahara-Afrika stammend) | Nicht indiziert | |
| Ungeschützter Oralverkehr mit Aufnahme von Sperma in den Mund (auch wenn Indexperson sicher HIV-infiziert ist) | | |
| Küssen | | |
| Kontakt von HIV mit der intakten Haut | | |